

レジメン名 ALB-NHL03早期維持相(5歳以上) week3,6,14,17(非ホジキンリンパ腫)

コメント Neut:500 $\geq$ 、Plt:8万 $\geq$ で開始。Neut<500の場合は500以上となるまで6-MP中断。 $\geq$ 500で半量で再開。6-MP 60mg/m<sup>2</sup>分1,7日間、PSL60mg/m<sup>2</sup>分3,5日間

日数 7日

化学療法		1病日
		Day1
注射	抗がん剤	<p>【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 0.04mg/kg 1日1回</p>
		<p>【滴下順：2】 中心静脈注射 オンコビン注射用 (1mg/V) 1.5mg/m<sup>2</sup> 大塚蒸留水 【20mL/A】 20mL 1日1回</p>
		<p>【滴下順：3】 静脈内注射 ソル・コーテフ注射用 【100mg/V】 100mg 1日1回</p>
		<p>【滴下順：4】 実施確認：未 筋肉内注射 ロイナーゼ注 (5000U/V) 6000単位/m<sup>2</sup> 大塚糖液5% 【20mL/A】 20mL 1日1回</p>
		<p>【滴下順：5】 中心静脈注射 エンドキサン 500mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液P L「フー」 【100mL/B】 100mL 1日1回 注入時間 1時間</p>